



FICHA TECNICA

Stimo^{66WP}

1. **NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:** STIMO 66 WP
2. **TIPO DE FORMULACION:** Polvo mojable
3. **DESCRIPCION:** Funguicida De uso Agrícola
4. **FORMULADOR:** Gowan Company



5. **TITULAR DEL REGISTRO:** ISAGRO COLOMBIA S.A.S
REGISTRO NACIONAL ICA Nº: 3702

6. **COMPOSICION:**

COMPONENTE	gm/Kg
Zoxamide	330
Cimoxanil	330

7. **MODO DE ACCION:** Es un fungicida que mezcla la acción de contacto y preventiva de Zoxamide con la acción traslaminar y curativa de Cimoxanil cuando el hongo está en incubación, especialmente en periodos de alta incidencia

Zoxamide: Actúa inhibiendo la división nuclear dentro de la célula.

Cimoxanil: Modo de acción desconocido.

8. **USO AGRICOLA:**

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.C.	P.R
Papa	Gota o Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	300 – 400 g/Ha o 100 - 133 gr/200 L de agua o 10 - 13 gr/Bomba de 20 L.*	3 días.	12 horas

9. **MODO DE EMPLEO:** STIMO 66 WP se puede aplicar con los equipos convencionales. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto. Para un óptimo rendimiento de STIMO



66 WP los equipos de aplicación deben estar bien calibrados.

- 10. COMPATIBILIDAD:** No Mezclar STIMO 66 WP con producto de carácter alcalino. No es fitotóxico a los cultivos y se emplea de acuerdo a las recomendaciones de uso
- 11. PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:** Bolsa de polietileno por 133 gr.

12. AVISO AL AGRICULTOR

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Mantenga el recipiente bien cerrado.

Mantenga lejos de alimentos, bebidas.

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

No tirar los residuos por el desagüe.

Usar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Guardar en sitio fresco y al abrigo de la luz solar directa.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR MAGRO S.A.
Autopista Medellín, Km 3.4 Centro Empresarial Metropolitano
Modulo 2, Bodega 36
PBX 8415050